

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



# ORD

## 1- CRISE AIGUE DEFERMETURE DE L'ANGLE IRIDO-CONEEN (CAFA) : Voir le cours sur les glaucomes

## 2- LES IRIDO CYCLITES = U A A :

- Inflammations de l'iris (iritis) et du corps ciliaire (cyclite) : on parle d'iridocyclite.
- C'est une **urgence thérapeutique** -Nécessité d'un bilan étiologique , bien que négatif dans plus de 50 % des cas !

### ➤ Le diagnostic est CLINIQUE

- **Rougeur + Douleur + BAV** - unilatérale ou bilatérale, souvent récidivante, parfois à bascule.
- L'examen à la lampe à fente retrouve :
  - Un **cercle péri keratique (CPK)**
  - Pupille **en myosis**
  - des PRC = **précipités retro cornéens** (dépôts de cellules inflammatoires à la face postérieure de la cornée) .
  - un phénomène de **Tyndall** : présence de protéines et de cellules inflammatoires circulant dans l'humeur aqueuse
  - parfois des **synéchies postérieures** ( irido cristalliniennes ) responsables d'une **déformation pupillaire** ;
  - sans oublier de rechercher des signes d'uvéite postérieure ou intermédiaire associés.

### ➤ Etiologies :

- **Infectieuses** : loco - régionales et générales / tuberculose , syphilis , HSV.....
- **Inflammatoires**: spondylarthropathies, LED, PR, Behcet, Crohn, sarcoidose....

### ➤ Traitement :

- 1- En urgence. 2- En ambulatoire.
- 3- Symptomatique :
  - **Corticothérapie locale.**
  - **Collyres mydriatiques**: prévenir et /ou rompre les synéchies postérieures.
- 4- Etiologique dès que c'est possible.
- 5- **Surveillance régulière et rapprochée jusqu'a guérison.**

**Définition:** Inflammation de l'uvéa antérieure

**Clinique :** **ORD + BAV +PRC + Tyndall +myosis + synéchies postérieures.**

**Examens complémentaires :** Bilan inflammatoires, étiologique

**Etiologies :**

. *Infectieuses* : loco - régionales et générales / tbc, syphilis , HSV.....

. *inflammatoires*: spondylarthropathies, LED, PR, Behcet, Crohn, sarcoidose....

**Traitement :** - Corticothérapie locale. -Collyres mydriatiques: prévenir . - Etiologique dès que c'est possible.

## 3- LES KERATITES AIGUES :

- **Inflammation de la cornée** souvent **infectieuse** qui s'accompagne **d'ulcérations superficielles**.
- Risque principal : **persistance d'opacités cornéennes**.

### ➤ Diagnostic : il est clinique :

- **Rougeur + Douleur + BAV** (variable fonction de la proximité de l'atteinte de l'axe visuel)
- rechercher : oeil sec, syndrome viral , une notion de diabète , de traumatisme, de port de lentilles de contact .
- Examen : complet, ODG, comparatif
  - **CPK + myosis**
  - **Ulcération cornéenne**: La fluorescéine s'imprègne au niveau des zones de déficit épithélial (zones d'absence d'épithélium) les faisant apparaître vertes.

### ➤ Formes étiologiques

- **K. traumatique** : - Les ulcérations et les érosions cornéennes sont mises en évidence par **l'instillation d'une goutte de fluorescéine**. - Rechercher un corps étranger sous la paupière.

- **K. Virales :**

#### a) Kératite à adénovirus :

- Peut compliquer une conjonctivite à adénovirus : on parle de **kerato conjonctivite à adénovirus ou épidémique**.
- caractérisée par des petites ulcérations disséminées = **Kératite Ponctuée Superficielle = KPS**
- Des **opacités cornéennes** , à l'origine d'une BAV peuvent mettre plusieurs mois voire plusieurs années, à régresser .
- Le traitement est le même que pour la conjonctivite à adénovirus.

**b) Kératite herpétique :**

- Ulcération cornéenne d'aspect **typique**, de forme arborescente = **ulcère dendritique**, parfois plus étendue, en **carte de géographie**.
- Le traitement : **antiviraux locaux en collyre ou en pommade (en plus du traitement général de tous les ulcères)**,
- L'évolution est le plus souvent favorable sous traitement, mais le risque est celui **des récurrences** et l'évolution vers une **kératite profonde par atteinte cornéenne stromale** pouvant laisser une BAV définitive.

- Une règle absolue : **ne jamais prescrire une corticothérapie locale devant toute ulcération** (risque d'aggraver l'ulcération voire de perforer la cornée)

**-Kératite herpétique = contre – indication des corticoïdes locaux**

- **Kératites bactériennes, parasitaires et mycosiques**

- Clinique : il s'agit d'un **abcès cornéen = infiltrat blanchâtre intra cornéen**
- Il complique une **ulcération traumatique** ou une ulcération **sous une lentille de contact** (+++).
- L'abcès cornéen diffuse souvent en chambre antérieure réalisant un **hypopion**.
- Le **prélèvement cornéen** avec **examen microbiologique** est *systématique* et une **mise en culture des lentilles de contact et de leur étui**.
- **TRT** : Une **hospitalisation** est nécessaire, **Double ATB thérapie IV + collyres ATB fortifiés toutes les heures**.
- **L'évolution** :
  - l'abcès peut s'**aggraver** (perforation cornéenne voire une endophtalmie)
  - ou **cicatriser** laissant en place une opacité cornéenne.

R ! En cas de port de lentilles de contact, se méfier d'une kératite amibienne.

- **Les kératites sur syndrome sec**

- **Sensation de grains de sable**, de corps étrangers.
- Le **diagnostic** repose sur :
  - un examen quantitatif et qualitatif de la sécrétion lacrymale.
  - La kératite est en général une **Kératite Ponctuée Superficielle : KPS**
- **L'étiologie** est le plus souvent : Une involution sénile des glandes lacrymales. - un syndrome de Gougerot-Sjogren.
- **La PEC** repose : -sur des substituts lacrymaux - une éviction des facteurs irritants comme le soleil (lunettes teintées) -l'occlusion temporaire ou permanente des points lacrymaux.

- **Les kératites d'exposition**

- lors d'une paralysie faciale, la mauvaise occlusion palpébrale est responsable d'une **exposition cornéenne**
- **Le traitement** = prévention de la kératite par **les protecteurs cornéens**.
- Ces kératites peuvent nécessiter une **tarsorrhaphie** (suture des deux paupières réduisant la fente palpébrale.)

➤ **Traitement :** **Traitement général de tous les ulcères : (devant toute kératite aigüe)**

**-Traitement médical en urgence**

**-Traitement symptomatique :**

- Vitamine A en pommade ophtalmique
- Pansement oculaire occlusif,
- Substituts lacrymaux
- Dilatation pupillaire

**-Mesures associées :**

- Arrêt du facteur favorisant (lentille de contact, corps étranger.....)
- lavage des mains.....

**-Contre – indication des corticoïdes.**

**Facteurs de risque : Traumatisme, port de lentilles de contact**

**Clinique : Rougeur + douleur + BAV + CPK + blepharospasme + larmoiement + photophobie = syndrome d'irritation du segment antérieur.**

**Etiologies : Adénovirus (KPS, opacités cornéennes séquellaires), Herpes (Ulcération dendritique ou en carte de géographie), K. bactériennes, parasitaires et fongiques (prélèvement local + mise en culture des LC et de leur étui).**

**Kératite herpétique = contre – indication des corticoïdes locaux**

#### 4- GLAUCOME NEOVASCULAIRE :

- Hypertonie oculaire secondaire a la prolifération de **neovaisseaux** en **segment antérieur** , a causé une **ischémie rétinienne** (rétinopathie diabétique, occlusion vasculaire rétinienne.....) et qui **bloquent** l'angle irido- cornéen empêchant l'excrétion de l'humeur aqueuse.

- **Cliniquement :**

- **Rougeur + Douleur + BAV - Hypertonie oculaire - Semi-mydriase**
- Rubéose irienne ( neo vaisseaux iriens ).
- Neo vaisseaux dans l'angle iridi- cornéens.
- Signes d'ischémie au fond d'oeil.
- 

-**Le traitement :** traitement de l'ischémie rétinienne

#### 5- L'ENDOPHTALMIE :

- **Urgence thérapeutique !!!**

- Infection oculaire **exogène** par inoculation directe du germe (chirurgie, traumatisme...), ou **endogène** par sepsis, bactériémie...

-**Clinique :** **Rougeur + Douleur + BAV + Inflammation du segment antérieur et postérieur.**

-**CAT :** EN URGENCE :

- Prélèvement microbiologique. pour examen, culture et antibiogramme
- Hospitalisation
- **ATB générale IV** (large spectre), puis adaptée a l'antibiogramme.
- **ATB locale en collyres et en injections intra oculaires.**
- **Corticothérapie locale et générale**
- Surveillance

#### 6- LES SCLERITES

- **Inflammation localisée** au niveau de la sclère ; uni ou bilatérale.

- **La rougeur est en secteur et ne disparaît pas à l'instillation d'un collyre vasoconstricteur .**

- **Douleur oculaire** surtout à la mobilisation du GO.

- Rechercher **une maladie de système** (**articulaire** : SPA, PAR, LED, **vasculaire** : PAN, Wegener, Behcet, **granulomateuse** : BK, sarcoidose, infectieuse.....)

-**Traitement étiologique et anti-inflammatoire (AINS et CTC).**

N.B : Elle est classée par certains auteurs dans les ORND

#### 7- LES EPISCLERITES

- Inflammation localisée à l'épisclère.

- **Rougeur** en secteur qui disparaît après instillation d'un collyre vasoconstricteur

- **Douleur** oculaire modérée/ sclérite, -examen du segment antérieur normal.

- Rechercher une maladie de système en cas de récurrence.

- traitement par AINS et / ou corticothérapie locale .

## **CONCLUSION :**

-Dans la plupart des situations, un **ORND** peut être diagnostiqué et traité par le médecin généraliste.

-En cas de **traumatisme**, de **douleur oculaire** importante, de **photophobie**, d'un **trouble visuel**, de **maladie chronique**, de **récurrence ou résistance au traitement**, une consultation ophtalmologique est indispensable. **La prescription des corticoïdes et des anesthésiques topiques est du domaine du spécialiste.** La **conjonctivite virale** est **hautement contagieuse** ; faire très attention pour ne pas la transmettre à d'autres patients ou à soi-même.

